

EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA

EVALUATION IN CONTINUA MEDICAL EDUCATION

VOL. 87/01/2006

Rev Argent Dermatol 2006; 87: 73-74.

- 1) **Las sales de cromo y cinabrio producen reacciones locales frecuentemente en las zonas tatuadas:**
- a) Verdadero.
 - b) Falso.
- 2) **El método de elección para el diagnóstico de infección por HPV (verrugas genitales) se basa en:**
- a) histopatología: técnicas de coloración de rutina (H&E) e histoquímica
 - b) biología molecular: PCR e hibridización
 - c) clínica: observación directa de las lesiones
 - d) dermatoscopia
- 3) **El pseudoxantoma elástico:**
- a) se transmite por mutación espontánea
 - b) se manifiesta más frecuentemente en el sexo masculino
 - c) presenta elastorrexis de fibras elásticas
 - d) presenta aumento de colágeno
- 4) **El hemangioma es un tumor muy frecuente en la infancia:**
- a) Verdadero.
 - b) Falso.
- 5) **Dentro de las afecciones que podemos esperar en zonas tatuadas encontramos:**
- a) reacciones granulomatosas
 - b) reacciones liquenoides
 - c) a) y b) son correctas
 - d) síndrome de Lyell
- 6) **La observación de las lesiones mediante la aplicación de ácido acético 5%, en el diagnóstico de infección por HPV ofrece:**
- a) alta especificidad: bajo porcentaje de falsos positivos
 - b) alta sensibilidad: bajo porcentaje de falsos negativos
 - c) baja especificidad: alto porcentaje de falsos positivos
 - d) baja sensibilidad: alto porcentaje de falsos negativos
- 7) **La etiología del pseudoxantoma elástico es desconocida, pero estudios genéticos actuales ubican la alteración en el gen ABCC6 (MRP6):**
- a) Verdadero.
 - b) Falso.
- 8) **Las reacciones de hipersensibilidad de los tatuajes transitorios se deben:**
- a) óxido de Zinc
 - b) sales de cromo
 - c) cinabrio
 - d) parafenilendiaminas
- 9) **En la fase proliferativa de los hemangiomas encontramos:**
- a) infiltración de células endoteliales
 - b) pericitos
 - c) a) y b) son correctas
 - d) lúmenes capilares grandes
- 10) **Las pápulas perladas peneanas y la micropapilomatosis labiales son: seleccione más de una opción**
- a) una condición fisiológica
 - b) una manifestación de infección por HPV
 - c) una manifestación de sífilis secundaria
 - d) uno de los diagnósticos diferenciales de infección por HPV
- 11) **En el pseudoxantoma elástico podemos observar:**
- a) máculas amarillas y pápulas de 1-4 mm
 - b) piel con esclerosis en axila
 - c) piel aterciopelada amarillenta
 - d) ninguna es correcta
- 12) **Para la remoción de tatuajes la destrucción térmica con láseres es efectiva; los más utilizados son:**
- a) Q-switched ruby láser

- b) Q-switched Nd: YAG láser
- c) doble frecuencia Nd: YAG
- d) todas son correctas

13) En la inmunohistoquímica de los hemangiomas encontramos:

- a) aumento del factor de crecimiento fibroblástico
- b) aumento del factor de crecimiento vascular endotelial
- c) colagenasa tipo IV
- d) todas son correctas

14) El tratamiento de la infección por HPV tiene por objetivo: seleccione más de una opción

- a) la eliminación del virus
- b) la eliminación de las lesiones sintomáticas
- c) la erradicación del contagio
- d) disminuir la transmisión del virus

15) Las lesiones en el pseudoxantoma elástico en general son:

- a) bilaterales
- b) simétricas
- c) zoniformes
- d) a) y b) son correctas

16) Los hemangiomas profundos:

- a) se ubican en dermis superficial
- b) son malformaciones vasculares
- c) se ubican en dermis reticular
- d) ninguna es correcta

17) El/los tratamientos de elección para lesiones anogenitales de HPV son: seleccione más de una opción

- a) imiquimod
- b) podofilino (resina)
- c) podofilotoxina
- d) crioterapia
- e) electrodissección
- f) TCA (tricloroacético)
- g) láser
- h) escisión simple
- i) ningún tratamiento
- j) ninguna de las opciones anteriores

18) Las lesiones oculares en el pseudoxantoma elástico presentan:

- a) hipopigmentación, brillo exagerado
- b) hiperpigmentación moteada en retina
- c) a) y b) son correctas

- d) no presenta lesiones oculares

19) Dentro de las complicaciones frecuentes de los hemangiomas podemos mencionar:

- a) profundización
- b) ulceración
- c) escasa involución
- d) retracción

20) El tratamiento para lesiones anogenitales por HPV debe incluir: seleccione más de una opción

- a) asesoramiento (counseling) sobre riesgo de otras ITS y forma de prevención
- b) testeo de HIV
- c) testeo de hepatitis
- d) testeo y/o control de otras ITS
- e) evaluación del grupo familiar (en infecciones de menores)
- f) control y seguimiento posterior
- g) control de la/s pareja/s sexuales

21) Las estrías angiodes oculares se presentan en el pseudoxantoma elástico en el 85% de los casos:

- a) Verdadero.
- b) Falso.

22) El hemangioma subglótico no es una complicación a esperar:

- a) Verdadero.
- b) Falso.

23) El manejo de los hemangiomas periorbitales es clínico exclusivamente:

- a) Verdadero.
- b) Falso.

24) En el pseudoxantoma elástico no se observan alteraciones neurológicas:

- a) Verdadero.
- b) Falso.

25) En el síndrome PHACES observamos (dos correctas):

- a) malformaciones cerebrales de fosa anterior
- b) malformaciones cerebrales de fosa posterior, anomalías arteriales
- c) malformaciones del cerebelo y coartación de la aorta
- d) anomalías oculares, defectos cardíacos