

# EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA

## EVALUATION IN CONTINUA MEDICAL EDUCATION

VOL. 88/04/2007

Rev Argent Dermatol 2007; 88: 246-248.

- 1) En la foliculitis pustulosa eosinofílica asociada al SIDA, el número de CD4+, por lo general es de:
- a) 3000 a 5000 por mm<sup>3</sup>
  - b) 20 a 30 por mm<sup>3</sup>
  - c) 250 a 300 por mm<sup>3</sup>
  - d) 10 a 20 por mm<sup>3</sup>.
- 2) Ayurveda:
- a) es un libro chino
  - b) es un tratado de medicina griega
  - c) un libro hindú dedicado a la enseñanza cosmética y de cuidado del cuerpo
  - d) todas son correctas.
- 3) Los queloides son:
- a) tumores fibrosos benignos, que exceden los límites de las heridas
  - b) pueden aparecer después de un trauma y las fibras de colágeno son gruesas hialinizadas con tendencia a formar nódulos
  - c) a) y b) son correctas
- 4) La dermis o matriz acelular es tejido dérmico sin elementos celulares:
- a) verdadero
  - b) falso.
- 5) En los tratamientos de las cicatrices hipertróficas:
- a) está establecido que la cirugía es de elección
  - b) es necesario combinar métodos
  - c) se usan los cc únicamente y siliconas.
- 6) El mastocitoma solitario sería causado por una mutación del protooncogen c kit que se expresa en:
- a) stem cell hematopoyéticas
  - b) en los melanocitos
  - c) en las neuronas
  - d) a) y b) son correctas.
- 7) El espiroadenoma ecrino es un adenoma de la glándula sudorípara ecrina que se desarrolla en la porción secretante y ductal de la misma y puede ser doloroso. Ante un tumor doloroso de la piel pensaría en:
- a) espiroadenoma ecrino
  - b) blue rubber bleb naevus y neuroma
  - c) leiomioma y glomangioma
  - d) todas son correctas.
- 8) La foliculitis pustulosa eosinofílica es igual a:
- a) urticaria papulosa
  - b) pustulosis subcórnea
  - c) foliculitis bacteriana
  - d) dermatitis papulosa.
- 9) En los fibroblastos de los queloides:
- a) existe un metabolismo anormal del colágeno, mayor síntesis de fibronectina y no responde al TGF beta
  - b) responden fundamentalmente al factor de crecimiento y de ello depende su tamaño
  - c) a) y b) son correctas.
- 10) Durante el imperio romano:
- a) se emplearon tópicos destinados al tratamiento de la caída capilar
  - b) caracayas era una gran biblioteca
  - c) el baño no era habitual para el cuidado del cuerpo.
- 11) La matriz acelular se emplea en la curación de heridas profundas en medicina regenerativa:
- a) verdadero
  - b) falso.

**12) La fisiopatología de los queloides:**

- a) es la producción excesiva de colágeno tipo XIII
- b) la producción de colágeno en mayor cantidad por algunos fibroblastos, pero aún no está comprobado
- c) a) y b) son correctas.

**13) Cuál de los siguientes signos están presentes en el mastocitoma solitario:**

- a) signo de Darier
- b) flushing, desencadenado por el roce
- c) dolor
- d) es incorrecta.

**14) Cuál de las siguientes asociaciones acerca del síndrome de Brooke Spiegler es incorrecta:**

- a) se asocia a espiroadenoma
- b) se asocia a cilindromas y tricoepitelomas
- c) neurinomas
- d) a) y b) son correctas.

**15) El patrón histopatológico de la foliculitis pustulosa eosinofílica es:**

- a) folicular
- b) infundibular
- c) de la glándula sebácea
- d) ecrina.

**16) Las matrices dérmicas acelulares de mamíferos son inmunológicamente inertes, por tener elementos celulares que generan rechazo inmunológico:**

- a) verdadero
- b) falso.

**17) En la época isabelina la caída capilar se debió a:**

- a) uso del sulfuro de mercurio como colorante
- b) uso del ruibarbo como tónico capilar
- c) empleo de jabones
- d) la pintura de albayalde utilizada como maquillaje.

**18) Las cicatrices hipertróficas:**

- a) crecen en forma continua y provocan dolor y limitaciones
- b) el colágeno engrosado está paralelo a superficie y forma nódulos

- c) ninguna es correcta.

**19) En el mastocitoma solitario al degranularse el mastocito se libera:**

- a) histamina
- b) triptasa
- c) norepinefrina
- d) a) y b) son correctas.

**20) Cuál de los enunciados siguientes es correcto:**

- a) el cilindroma es un tumor que aparece en cuero cabelludo y se diferencia hacia estructuras apocrinas
- b) no se hereda en forma autosómica dominante.
- c) existen similitudes entre el Cilindroma y el Espiroadenoma y a veces es difícil de hacer el diagnóstico diferencial.
- d) a) y c) son correctas.

**21) La foliculitis pustulosa eosinofílica se puede asociar a:**

- a) SIDA
- b) trasplante de médula ósea
- c) linfomas
- d) síndrome mielodisplásico
- e) todas las anteriores.

**22) El empleo de los peeling en Europa:**

- a) aparecen en el siglo XIX
- b) los dermatólogos emplean diferentes ácidos como: TCA, FENOL, ÁCIDO SALICÍLICO
- c) los gitanos difunden el empleo de los peeling
- d) a), b) y c) son correctas
- e) a), b) y c) son incorrectas.

**23) Dentro de la fisiopatología de los queloides y cicatrices hipertróficas qué factores debemos considerar:**

- a) fibroblastos con actividad anormal, déficit de ácido hialurónico
- b) factor de crecimiento transformador beta
- c) inhibidor del activador del plasminógeno 1 y posible alteración de la apoptosis
- d) a) y b) son correctas.

**24) Cuál de los marcadores que se enuncian a continuación, se expresan en el espiroadenoma ecrico:**

- a) citoqueratina
- b) actina del músculo liso
- c) HMB 45
- d) a) y b) son correctas.

**25) La droga por vía bucal de elección para el tratamiento de la foliculitis pustulosa eosinofílica es:**

- a) isotretinoína
- b) ciclosporina
- c) dapsona
- d) tetraciclinas
- e) indometacina.

**26) La degranulación del mastocito puede producirse por estímulos físicos y químicos tales como:**

- a) frío-calor
- b) roce mecánico
- c) aspirina, codeína y opiáceos
- d) existen similitudes entre el cilindroma

y el espiroadenoma y a veces es difícil de hacer el diagnóstico diferencial

- e) a) y c) son correctas.

**27) Durante la edad media:**

- a) la cirugía sólo se practicaba en hospitales
- b) los barberos realizaban cirugía, sacaban dientes, empleaban ventosas, enemas, flebotomía
- c) el cirujano era siempre médico con título universitario
- d) el baño era practicado como norma de higiene.

**28) Los fibroblastos:**

- a) son iguales en los queloides y en las cicatrices hipertróficas
- b) en los queloides producen grandes cantidades de colágeno y no responden a los factores de crecimiento
- c) en los queloides el colágeno está ordenado paralelamente a la superficie de la piel.