

EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA

EVALUATION IN CONTINUA MEDICAL EDUCATION

VOL. 89/04/2008

Rev Argent Dermatol 2008; 89: 246-247.

- 1) **Marque la respuesta correcta con respecto a la afección de las mucosas en sífilis secundaria:**
- a) la mucosa oral es la más frecuentemente comprometida
 - b) suelen ser lesiones múltiples no dolorosas
 - c) las lesiones en cavidad oral localizan en labios, lengua y paladar
 - d) todas son correctas
- 2) **La pustulosis exantemática aguda generalizada:**
- a) se engloba dentro de las pustulosis amicrobianas
 - b) es de frecuente presentación
 - c) de etiología desconocida
 - d) con inicio insidioso y de lenta resolución
- 3) **La adenomatosis erosiva del pezón puede prestarse al diagnóstico diferencial con (señale la correcta):**
- a) mama supernumeraria
 - b) botriomicoma
 - c) espiroadenoma apocrino
 - d) enfermedad de Paget
- 4) **Usted haría diagnóstico diferencial de lesiones mucosas con:**
- a) eritema multiforme
 - b) carcinoma espinocelular
 - c) leucoplasia
 - d) candidiasis
 - e) todas son correctas
- 5) **La etiología más frecuente de la pustulosis exantemática aguda generalizada es:**
- a) infecciones virales
 - b) fármacos
 - c) reacción de hipersensibilidad al mercurio
 - d) picadura de arañas
- 6) **La edad promedio de la aparición de la adenomatosis erosiva del pezón es:**
- a) pubertad
 - b) cuarta década de la vida
 - c) infancia
 - d) séptima década de la vida
- 7) **El diagnóstico de sífilis secundaria se realiza con:**
- a) biopsia de lesiones
 - b) hallazgos clínicos
 - c) laboratorio y cultivo
 - d) serología
- 8) **La tasa de incidencia de la pustulosis exantemática aguda generalizada es:**
- a) 1 a 5 casos por millón
 - b) 1 a 5 casos por 100.000
 - c) 1 a 5 casos por 10.000
 - d) 1 a 5 casos por 1.000
- 9) **En la adenomatosis erosiva del pezón la secreción por decapitación es característica de las neoplasias:**
- a) ecrinas
 - b) foliculares
 - c) apocrinas
 - d) neurales
- 10) **Sífilis secundaria: marque lo correcto:**
- a) afecta frecuentemente a personas de edad adulta > 40 años
 - b) predomina en sexo femenino
 - c) se manifiesta entre 2-6 meses de la primoinfección
 - d) las lesiones cutáneas típicas son pápulas eritematosas denominadas sifilides opalinas

11) La pustulosis exantemática aguda generalizada compromete órganos internos:

- a) verdadero
- b) falso

12) La adenomatosis erosiva del pezón es una neoplasia:

- a) benigna y apocrina
- b) maligna y apocrina
- c) benigna y ecrina
- d) maligna y ecrina

13) En la sífilis secundaria la infección por *Treponema pallidum* se produce únicamente por el contacto con sitios lacrados cutáneos, no siendo contagiosas las lesiones mucosas:

- a) verdadero
- b) falso

14) La histopatología característica de la pustulosis exantemática aguda generalizada es:

- a) pústulas intraepidérmicas o subcór-

neas espongíóticas asociadas a edema dérmico o vasculitis

- b) pústulas intraepidérmicas o subcórneas asociadas a granulomas no caseificantes
- c) se acompaña de un infiltrado linfoplasmocitario
- d) la inmunofluorescencia es positiva

15) El siringocistoadenoma papilífero posee diferenciación:

- a) ecrina
- b) mucinosa
- c) sebácea
- d) apocrina

16) El tratamiento de la pustulosis exantemática aguda generalizada consiste en:

- a) antibióticos orales
- b) antivirales orales
- c) cloroquina
- d) retirar la causa desencadenante y terapéutica sintomática