

EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA

EVALUATION IN CONTINUA MEDICAL EDUCATION

VOL. 90/03/2009

Rev Argent Dermatol 2009; 90: 182-184.

1) En la enfermedad de Darier:

- a) hay mutaciones en el gen ATP 2 A 2
- b) el gen ATP 2 A 2 localiza en el brazo largo del cromosoma 12
- c) hay desequilibrio de las concentraciones de calcio en citoplasma y organelas intracelulares
- d) a. b. y c. son correctas
- e) solo a. es correcta

2) Tumores anexiales de la piel: marque la afirmación correcta:

- a) se dividen en tres grupos: tumores foliculares, sebáceos y apócrinos
- b) los tumores sebáceos son neoplasias marcadoras del Síndrome de Cowden
- c) la diferenciación habitual es la bifásica, hacia dos elementos anexiales
- d) la mayoría son benignos y surgen de novo
- e) la malignidad de estos tumores está determinada sólo por la presencia de metástasis

3) La telangiectasia hemorrágica hereditaria:

- a) es una enfermedad autosómica recesiva
- b) generalmente no afecta la cara
- c) la epistaxis es una de las manifestaciones de inicio de la enfermedad
- d) las lesiones se mantienen estables en el tiempo
- e) es más importante el sangrado cutáneo que el de mucosas

4) Señale el concepto correcto:

- a) toda la piel del paciente con psoriasis es vulnerable a la enfermedad

- b) participa la célula de Langerhans que presenta el Ag a los LT
- c) los LT activados son los C4 th1
- d) enfermedad de base inmunogenética
- e) todas son correctas

5) La paniculitis lúpica es:

- a) septal
- b) lobular
- c) vasculítica
- d) ninguna es correcta

6) Las lesiones mucosas del Darier:

- a) pueden generar severo daño y comprometer la deglución
- b) la conjuntiva ocular es afectada y puede originarse ceguera
- c) afectan la boca, paladar duro, mucosa alveolar, también lengua y resto de la mucosa oral
- d) solo a) y b) son correctas

7) La clasificación propuesta por la WHO para tumores anexiales excluye:

- a) a las lesiones hamartomatosas
- b) a las lesiones quísticas e hiperplásicas
- c) a los tumores con diferenciación mixta como el siringoma condroide
- d) ninguna es correcta
- e) a) y b) son correctas

8) Las principales células que participan en la fisiopatogenia de la psoriasis son:

- a) c. Langerhans, LT CD4 th-1, queratinocitos, c. endoteliales, macrófagos, neutrófilos, mastocitos
- b) c. Langerhans, LT CD8, queratinocitos, células endoteliales, macrófagos, neutrófilos, mastocitos.

- c) c. Langerhans, LT CD4 th-2, queratinocitos, células endoteliales, macrófagos, neutrófilos, mastocitos
- d) c. Langerhans, LT CD4 th-1, queratinocitos, macrófagos, neutrófilos
- e) c. Langerhans, LT CD4 th-1, queratinocitos, macrófagos, eosinófilos

9) En la telangiectasia hemorrágica hereditaria, en cuanto a los criterios diagnósticos, lo siguiente es correcto excepto:

- a) historia familiar
- b) malformaciones vasculares hepáticas
- c) epistaxis
- d) várices en miembros inferiores
- e) telangiectasias cutáneo-mucosas

10) La paniculitis lúpica se trata preponderantemente con:

- a) corticoides en forma de infiltraciones
- b) corticoides vía bucal
- c) antipalúdicos
- d) micofenolato mofetil

11) En la enfermedad de Darier:

- a) puede haber severas complicaciones ante la exposición solar
- b) no es frecuente el prurito
- c) puede exacerbarse por infecciones virales o bacterianas
- d) a) y c) son correctas

12) Señale el concepto incorrecto:

- a) el neuropéptido SP podría ser el factor desencadenante de la psoriasis
- b) los vasos papilares constitucionalmente son anómalos
- c) en la psoriasis se produce una respuesta angiogénica
- d) la IL-6 es la responsable de la migración de los neutrófilos hacia la epidermis
- e) el TNF está presente en todos los pasos fisiopatogénicos de la psoriasis

13) Con respecto a los tumores foliculares, no es cierto que:

- a) los tumores foliculares más frecuentes en esta serie son los pilomatrixomas
- b) los eventos secundarios descritos en los pilomatrixomas estarían relacionados con el tiempo de evolución de los mismos
- c) el pilomatrixoma proliferante no constituiría una lesión intermedia entre el

pilomatrixoma y su contraparte maligna

- d) una variante de tricoepitelioma es la forma desmoplásica
- e) los tricofoliculomas se presentan con frecuencia en la región facial

14) Entre los estudios complementarios de la telangiectasia hemorrágica hereditaria se deben solicitar todos los siguientes excepto:

- a) gasometría arterial
- b) ionograma
- c) radiografía de tórax
- d) endoscopia gastrointestinal
- e) ecocardiograma

15) La paniculitis lúpica suele presentar como secuela importante:

- a) atrofia
- b) cicatriz
- c) esclerosis
- d) todas son correctas

16) En el Darier se presentan:

- a) acantolisis y núcleos pignóticos
- b) acantolisis subcórnea
- c) acantolisis, hendiduras suprabasales (lagunas) y cuerpos redondos
- d) imagen en pared que se desmorona

17) Tumores sebáceos: marque la afirmación correcta:

- a) los carcinomas sebáceos constituyen la segunda neoplasia anexial maligna, luego de los carcinomas apócrinos
- b) sólo los adenomas sebáceos son marcadores del Síndrome de Muir Torre
- c) el Síndrome de Muir Torre se caracteriza por la asociación de tumores sebáceos y neoplasias internas
- d) los carcinomas sebáceos suelen afectar las extremidades
- e) los adenomas sebáceos fueron más frecuentes en mujeres de edad

18) Sobre los tumores de origen sudoríparo, todas las respuestas son correctas excepto:

- a) los siringomas fueron los tumores sudoríparos más frecuentes
- b) dos hidradenomas papilares fueron descritos en el sexo masculino en la serie presentada
- c) el adenoma papilar sería la contraparte écrina del adenoma tubular, de origen apócrino
- d) los carcinomas apócrinos son excepcionales
- e) el carcinoma adenoide quístico primario de la piel debe diferenciarse de los tumores de origen en tejido salival

19) Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:

- a) la psoriasis es una enfermedad determinada genéticamente; el paciente presenta toda su piel vulnerable a la enfermedad, los vasos papilares son anómalos, está asociada a una disregulación y activación del sistema inmune, se produce la presentación de un antígeno a los LT del ganglio linfático regional, liberación de interleuquinas y quimio-

quinas que modulan el proceso fisiopatogénico destacándose el rol del TNF alfa

- verdadera
- falsa

20) Con respecto a la terapéutica de la telangiectasia hemorrágica hereditaria:

- a) deben hacerse transfusiones sanguíneas preventivas
- b) no se recomiendan los suplementos de hierro y ácido fólico
- c) el 20% de los pacientes fallece a causa de complicaciones por el tratamiento
- d) las epistaxis severas se pueden tratar con combinación de etinilestradiol y noretisterona
- e) el uso de N-acetilcisteína suprime las epistaxis nocturnas

21) La papulosis fibrosa blanca del cuello:

- a) tiene mal pronóstico
- b) se ubica exclusivamente en el cuello y es benigna
- c) se asocia con estrías angioides
- d) se asocia con disección de aorta