

**CASO BREVE**

**REVISTA ARGENTINA DE DERMATOLOGÍA**

Propiedad de la Asociación Argentina de Dermatología

ISSN 1851-300X | Número de Propiedad Intelectual 20459734

# **Dermatosis Neglecta. A propósito de un caso**

**DERMATOSIS NEGLECTA. ABOUT A CASE**



**Jul- Sep 2018 | Vol. 99 N°3**

Caso breve  
Rev. argent. dermatol. 2018; 99 (3): 61– 65.  
Publicado en línea 2018. Septiembre / Published online September 2018.  
Dermatosis Neglecta. A propósito de un caso

#### Autores | Contacto

G Bloch \*, A Pinilla \*\*, A Traficante \*\* y V Gegdyszman \*\*

\* Jefa del Servicio de Dermatología. Hospital Municipal “Diego E. Thompson”. San Martín. Provincia de Buenos Aires. Argentina.

\*\* Alumnas de la Carrera de “Especialista en Dermatología”. Distrito IV. Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Hospital Municipal “Diego E. Thompson”. 105 Avellaneda 33. San Martín. Provincia de Buenos Aires. Argentina.

e-mail: blochgrete@hotmail.com

Los autores no poseen conflictos de interés.

Recibido: 29.01.2018.-

Aceptado para su Publicación: 03.07.2018.-

## RESUMEN

La dermatosis neglecta es una entidad benigna poco frecuente, con predominio en pacientes adultos, secundario a una hiperalgesia. Presentamos una paciente de 78 años con antecedente de herpes zoster en rostro, con lesiones características de esta enfermedad.

## PALABRAS CLAVES

dermatosis neglecta, hiperqueratosis, higiene, alcohol etílico, hiperalgesia.

## SUMMARY

Dermatosis neglecta is a rare benign entity with predominance in adult patients, secondary to a hyperalgesia. We present a 78-year-old patient with a history of herpes zoster on the face, with characteristic lesions of this disease.

## KEY WORDS

dermatosis neglecta, hyperkeratosis, hygiene, ethyl alcohol, hyperalgesia.

## INTRODUCCIÓN

La dermatosis neglecta es una entidad clínica de etiología aún no bien conocida, antes llamada “dermatosis sucia de Duncan”, se caracteriza por la presencia de placas hiperpigmentadas del tipo papilomatosas, asintomáticas, localizadas en zonas donde el paciente tiene poca higiene diaria y en áreas, donde el mismo tiene aprehensión de tocarse por hiperalgesia secundaria.<sup>6</sup>

Llamativamente son lesiones que desaparecen completamente con alcohol isopropílico o alcohol etílico.<sup>1</sup>

Presentamos un caso de dermatosis neglecta, en una zona donde la paciente presentaba hiperalgesia secundaria y dada la localización de las lesiones, obligaban al diagnóstico diferencial, con otras patologías de clínica similar.

## CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino, de 78 años de edad, con antecedentes personales de hipertensión arterial, en tratamiento con enalapril e hipotiroidismo controlado con levotiroxina.

Como antecedente de relevancia, presentó un herpes zoster en rostro hacía diez meses, cursando en el momento de la consulta con una neuralgia post-herpética en hemicara izquierda.

La paciente refería la aparición de unas lesiones en rostro, de dos meses de evolución, de aspecto sucio, no removibles con la higiene habitual.

Al examen físico se observaban placas hiperpigmentadas, queratósicas, discretamente papilomatosas al tacto, de coloración marrón, mal delimitadas, que abarcaban el dermatoma facial en hemicara izquierda. (Fig 1) No presentaba afección de cuero cabelludo, de mucosas, ni tampoco compromiso sistémico.

Dada la distribución en dermatoma facial en hemicara izquierda, el aspecto de las lesiones y la sospecha clínica, se llevó a cabo la maniobra diagnóstico-terapéutica de fricción, con algodón humedecido en alcohol etílico al 70%<sup>1</sup>, el que eliminó las lesiones a pesar de la hiperalgesia de la paciente, revelando en el área tratada, una piel de apariencia normal, confirmando el diagnóstico de esta entidad. (Fig 2)

La paciente no precisó tratamiento adicional. Se explicó la benignidad de las lesiones y las medidas que debía tomar para hacerlas desaparecer.

## COMENTARIO

La dermatosis neglecta se caracteriza por presentar máculas o placas hiperpigmentadas, de coloración marrón o negras, de aspecto papilomatoso, asintomáticas, que aparece en individuos mayores con hábitos de higiene deficitarios en zonas dolorosas, como ocurre en este caso.<sup>4</sup> Las lesiones desaparecen por completo tras frotarlas con alcohol isopropílico o alcohol etílico. Se han

publicado pocos casos de esta entidad y su prevalencia esta subvalorada, siendo seguramente más frecuente de lo que se piensa.<sup>5</sup>

La causa no se conoce pero se cree que las lesiones, surgen como consecuencia del retraso en la maduración de los queratinocitos, con posterior retención de melanina, junto con la subsiguiente acumulación de sebo, sudor, corneocitos y microorganismos, en áreas donde la higiene está disminuida.<sup>1,3</sup>

Como diagnósticos diferenciales se plantearon: papilomatosis reticular y confluyente de Gougerot y Carteaud, acantosis nigricans, pseudo acantosis nigricans, dermatitis artefacta, ictiosis, nevus e.<sup>1,2</sup>

Dado que el diagnóstico es confirmado por el frote vigoroso de las lesiones, con gasa impregnada con alcohol isopropílico al 70% o alcohol etílico<sup>1</sup>, no es necesario realizar una toma de biopsia ni otros análisis de laboratorio. Además su terapéutica es rápida y simple.<sup>4</sup>

## CONCLUSIÓN

La dermatosis neglecta es una dermatosis poco frecuente, benigna, probablemente subdiagnosticada, por lo tanto, se resalta la importancia de un diagnóstico precoz para evitar pruebas adicionales innecesarias.

Una vez reconocida, tiene un fácil diagnóstico clínico y un tratamiento rápido, la biopsia no suele ser necesaria, reservándose para casos excepcionales de duda diagnóstica.



Fig 1:placas hiperpigmentadas, queratósicas, de coloración marrón, que abarcaban el dermatoma facial, en hemicara izquierda.



Fig 2: piel de apariencia normal tras frotar con una gasa impregnada en alcohol etílico. Nótese la coloración de la gasa.

## REFERENCIAS

1. Martín Gorgojo A, Alonso – Usero V, Gavrilova M y Jorda Cuevas E. Dermatosis Neglecta o terra firma-forme dermatosis. Cartas Científico-Clinicas 2011.
2. Meseguer-Yebra C, Meseguer-Yebra P, Garrido-Ríos AA y Sánchez Estella J. Terra Firma Forme dermatosis. Ann Pediatr (Barcelona) 2015; 82 (5): 222-223.
3. Santarpia M y Guarneri C. Terra firma-forme dermatosis. Eur J Intern Med 2016; 34e1-2.
4. Sartori S, de la Peña A y Ulibarrie A. Dermatosis Neglecta: presentación de un caso. Dermatol Argent 2012; 18 (2): 47-48.
5. **Abhijit Saha, Joly Seth, Ayush Bindal, Asit Baran Samanta, Surajit Gorai y Amita Sharma.** Dermatosis Neglecta: An Increasingly Recognized Entity with Review of Literature. **Indian J Dermatol** 2016; 61 (4): 450-452.
6. Marín Hernández E, González Ríos RD y Rodríguez Manzo A. Dermatosis neglecta, una dermatosis poco conocida. Informe de dos pacientes de la tercera edad. Dermatología CMQ 2016; 14 (3): 232-235.