REVISTA ARGENTINA de DERMATOLOGÍA

Rev Argent Dermatol
Volumen 89 Nº 1 - Enero - Marzo 2008

ASOCIACIÓN ARGENTINA de DERMATOLOGÍA

Editada en Buenos Aires
Argentina - Publicación Trimestral
ISSN 0325-2787
ISSN ON-LINE 1851-300X

EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA
EVALUATION IN CONTINUA MEDICAL EDUCATION

VOL. 89/01/2008

Rev Argent Dermatol 2008; 89: 59-60.

1) La porfiria cutánea tardía se divide en dos tipos, en qué órgano u órganos se produce el defecto enzimático que les da origen?

- ❑ a) el déficit enzimático en el tipo I se produce a nivel de los eritrocitos
- ❑ b) el déficit enzimático en el tipo I se produce en el hígado
- ❑ c) el déficit enzimático en el tipo I se produce en todos los órganos
- ❑ d) el déficit enzimático en el tipo II se produce en el hígado

2) Cuál es el grupo etario más afectado por cáncer no melanoma de piel?

- ❑ a) hombres entre 20 y 50 años
- ❑ b) hombres entre 60 y 70 años
- ❑ c) hombres mayores de 70 años

3) El compromiso cutáneomucoso en la enfermedad de Crohn es aproximadamente de:

- ❑ a) 10%
- ❑ b) 30%
- ❑ c) 50%
- ❑ d) 80%

4) Cuál es la prevalencia del virus de la hepatitis C (VHC) en casos de PCT esporádica?

- ❑ a) la prevalencia se ubica entre el 50 y el 60%
- ❑ b) la prevalencia es menor al 10%
- ❑ c) la PCT se asocia con el VHC

5) El 77,8 % de los cánceres no melanoma de piel corresponden al carcinoma basocelular:

- ❑ a) verdadero
- ❑ b) falso

6) Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- ❑ a) el cáncer no melanoma de piel tiene una incidencia de 600.000 casos anuales en Estados Unidos
- ❑ b) el cáncer no melanoma de piel es más frecuente en el sexo femenino
- ❑ c) el cáncer no melanoma de piel es más frecuente en hombres entre 40 y 55 años

7) La localización cutáneomucosa más frecuente de la enfermedad de Crohn es:

- ❑ a) perianal
- ❑ b) bucal
- ❑ c) miembros inferiores
- ❑ d) ombligo

8) Respecto del depósito de hierro en los pacientes con PCT. Marque la opción correcta:

- ❑ a) la PCT no debe considerarse un marcador de hemocromatosis
- ❑ b) la disminución del hierro permite que la enzima UPD retome su actividad normal
- ❑ c) la dieta libre de hierro no contribuye a la mejoría del cuadro clínico y del laboratorio

9) De las siguientes manifestaciones cuál no pertenece o se asocia a la enfermedad de Crohn:

- ❑ a) eritema nudoso
- ❑ b) pioderma gangrenoso
- ❑ c) dedos en palillo de tambor
- ❑ d) mixedema pretibial

ISSN 0325-2787
ISSN ON-LINE 1851-300X

10) Respecto a los factores de riesgos para padecer cáncer no melanoma de piel:

❑ a) la fotoexposición prolongada de tipo ocupacional es de mayor importancia
❑ b) la fotoexposición periódica (ej: vacaciones) y excesiva es más importante
❑ c) la fotoexposición no constituye un factor determinante del CNMP

11) Cuál es la dosis de cloroquina recomendada en pacientes con PCT?

❑ a) 100 mg dos veces por semana
❑ b) 100 mg todos los días
❑ c) 100 mg por semana
❑ d) 200 mg dos veces por semana

12) El granuloma de la enfermedad de Crohn es:

❑ a) caseoso mayormente
❑ b) centrofolicular
❑ c) sarcoidal
❑ d) eosinofólico

13) Cuál es la segunda localización topográfica más frecuente afectada por cáncer no melanoma de piel?

❑ a) cabeza y cuello
❑ b) tronco
❑ c) miembros superiores
❑ d) miembros inferiores

14) Ante un paciente con PCT que no mejora con flebotomías repetidas, Ud. evaluaría el diagnóstico de hemocromatosis?

❑ a) verdadero
❑ b) falso